



Semillas de Urochloa ruziziensis, Cultivar Ruziziensis. *Urochloa ruziziensis seeds, Ruziziensis Cultivar.* Sementes de Urochloa ruziziensis, Cultivar Ruziziensis.

Nombre común: Ruziziensis

La cultivar más utilizada hoy en Brasil y otros países en cultivos integrados de agricultura con ganadería. Fue introducida desde Australia y está muy adaptada, pero hay que observar algunas condiciones para su cultivo. **Agronomía:** recomendada para suelos de alta fertilidad, poco tolerante a la acidez y poco tolerante a la humedad. Una cultivar muy susceptible al salivazo de los pastos. Su producción de hojas permite buenas coberturas de paja para siembra directa, o buena producción de forraje (con hasta 9% de proteína cruda) cuando cultivada entre las líneas de maíz. En este caso permite buen pastoreo hasta la próxima siembra de granos. **Como manejar los potreros:** siempre tapar/incorporar las semillas al suelo (2 - 3 cm). Primer pastoreo con animales livianos, posiblemente en 50 - 70 días. Muy importante el manejo de altura del pasto: entrada 30cm y salida con 20cm.

Common name: Ruziziensis

It was introduced from Australia and is well-adapted, but some conditions must be observed for its cultivation. **Agronomy:** recommended for high-fertility soils, with little tolerance to acidity poorly drained soils. A cultivar highly susceptible to grass spittlebugs. Its leaf production allows for good straw cover for direct seeding or good forage production (with up to 9% crude protein) when cultivated between corn rows. In this case, it allows for good grazing until the next grain planting. **How to manage pasture plots:** always cover/incorporate seeds into the soil (2 - 3 cm). First grazing with young animals with a little weight, possibly in 50 - 70 days. Grass height management is very important: entry at 30cm and exit at 20cm.

Nome comum: Ruziziensis

Foi introduzida da Austrália e está bem adaptada, mas algumas condições devem ser observadas para o seu cultivo. **Agronomia:** recomendada para solos de alta fertilidade, com pouca tolerância à acidez e à umidade. Uma cultivar muito suscetível à cigarrinha das pastagens. Sua produção de folhas permite boas coberturas de palha para plantio direto, ou uma boa produção de forragem (com até 9% de proteína bruta) quando cultivada entre as fileiras de milho. Neste caso, permite bom pastoreio até o próximo plantio de grãos. **Como manejar os pastos:** sempre cobrir/incorporar as sementes no solo (2 - 3 cm). Primeiro pastejo com animais leves, possivelmente em 50 - 70 dias. O manejo da altura da grama é muito importante: entrada com 30cm e saída com 20cm.

