



Semillas de Urochloa brizantha, Cultivar Xaraés.
Urochloa brizantha seeds, Xaraés Cultivar.
Sementes de Urochloa brizantha, Cultivar Xaraés.

Nombre común: Xaraés o Toledo

Lanzada por Embrapa - Brasil, en 2003. La cultivar más productiva entre las cultivares de Urochloa brizantha, muchas veces superando 20 toneladas de materia seca por hectárea. Más exigente en manejo de todas ellas, pues cuando se ponen viejas, las vacas pueden rechazarla. Posee un ciclo muy largo hasta el florecimiento, lo que permite un largo periodo de pastoreo en la estación lluviosa.

Agronomía: recomendada para suelos de mediana fertilidad, medianamente tolerante a la acidez y poco tolerante a la humedad. Una cultivar medianamente tolerante a la sequía y tolerante al salivazo de los pastos. Por otro lado muy responsiva a las fertilizaciones. Su producción forrajera puede llegar a 20 toneladas por hectárea con tenores de proteína cruda de 9 hasta 10%. Puede ser mezclada con semillas de Decumbens, Xaraés y también Mombaza. **Como manejar los potreros:** siempre tapar/incorporar las semillas (2 - 3 cm) luego de sembrarlas. Primer pastoreo con animales livianos, posiblemente en 60 - 80 días. Muy importante el manejo de altura del pasto: entrada 35cm y salida con 15cm.

Common name: Xaraés or Toledo

*Released by Embrapa - Brazil in 2003. The most productive cultivar among Urochloa brizantha cultivars, often surpassing 20 tons of dry matter per hectare. More demanding in management than others, as when they age, cows may reject it. It has a very long cycle until flowering, allowing for a long grazing period in the rainy season. **Agronomy:** Recommended for medium-fertility soils, moderately tolerant to acidity, and not very tolerant poorly drained soils. A cultivar moderately tolerant to drought and tolerant to grass spittlebugs. On the other hand, it is very responsive to fertilization. Its forage production can reach 20 tons per hectare with crude protein levels of 9 to 10%. It can be mixed with seeds of Decumbens, Xaraés, and also Mombaza. **How to manage the pasture plots:** Always cover/incorporate seeds (2 - 3 cm) after planting. First grazing with young animals with a little weight, possibly in 60 - 80 days. Grass height management is very important: entry at 35cm and exit at 15cm.*

Nome comum: Xaraés ou Toledo

Lançada pela Embrapa - Brasil em 2003. A cultivar mais produtiva entre as cultivares de Urochloa brizantha, muitas vezes superando 20 toneladas de matéria seca por hectare. Mais exigente em manejo do que as outras, pois quando “envelhecem”, as vacas podem rejeitá-la. Possui um ciclo muito longo até o florescimento, permitindo um longo período de pastoreio na estação chuvosa.

Agronomia: recomendada para solos de fertilidade média, moderadamente tolerante à acidez e pouco tolerante à umidade. Uma cultivar moderadamente tolerante à seca e tolerante à cigarrinha das pastagens. Por outro lado, é muito responsiva à adubação. Sua produção forrageira pode atingir 20 toneladas por hectare com teores de proteína bruta de 9 a 10%. Pode ser misturada com sementes de Decumbens, Xaraés e também Mombaza. **Como manejar os piquetes:** sempre cobrir/incorporar as sementes (2 - 3 cm) depois de semear. Primeiro pastejo com animais leves, possivelmente em 60 - 80 dias. O manejo da altura da forrageira é muito importante: entrada com 35cm e saída com 15cm.

