



Semillas de Urochloa humidicola, Cultivar Llanero.
Urochloa humidicola seeds, Llanero Cultivar.
Sementes de Urochloa humidicola, Cultivar Llanero.

Nombre común: Llanero

Presentada por el CIAT - Colombia. Muy rápidamente adoptada por muchos ganaderos en Colombia, Brasil y en todo el mundo tropical. **Agronomía:** recomendada para suelos de baja fertilidad, tolerante a la acidez y con exceso de humedad. Una cultivar muy rústica, tolerante a la sequía y al salivazo de los pastos. Su producción forrajera puede llegar a 12 toneladas por hectárea con tenores de proteína cruda de 6 - 8%. **Como manejar los potreros:** siempre tapar/incorporar las semillas luego de sembrarlas. Como su establecimiento es lento, es recomendable sembrarla mezclada con otra cultivar, por ejemplo Decumbens o Brizantha. En algunas fincas esta mezcla permanecerá establecida en campo con excelentes resultados para el ganado. Luego del segundo año de siembra la Humidicola dominará el campo y ocupará todo el espacio en el potrero.

Common name: Llanero

Introduced by CIAT - Colombia. Quickly adopted by many ranchers in Colombia, Brazil, and throughout the tropical world. **Agronomy:** recommended for low-fertility soils, tolerant to acidity, and with excess moisture. A very rustic cultivar, tolerant to drought and grass spittlebugs. Its forage production can reach 12 tons per hectare with crude protein levels of 6 - 8%. **How to manage pasture plots:** always cover/incorporate seeds after planting. Since its establishment is slow, it is recommended to sow it mixed with another cultivar, for example, Decumbens or Brizantha. On some farms, this mixture will remain established in the field with excellent results for the livestock.

Nome comum: Llanero

Apresentada pelo CIAT - Colômbia. Rapidamente adotada por muitos pecuaristas na Colômbia, Brasil e em todo o mundo tropical. **Agronomia:** recomendada para solos de baixa fertilidade, tolerante à acidez e com excesso de umidade. Uma cultivar muito rústica, tolerante à seca e à cigarrinha das pastagens. Sua produção forrageira pode atingir 12 toneladas por hectare com teores de proteína bruta de 6 a 8%. **Como manejar os pastos:** sempre cobrir/incorporar as sementes depois de semear. Como o estabelecimento é lento, é recomendável plantá-la misturada com outra cultivar, por exemplo, Decumbens ou Brizantha. Em algumas fazendas, essa mistura permanecerá estabelecida no campo com excelentes resultados para o gado.

